

HOJA INFORMATIVA

Estadísticas mundiales sobre el VIH

- 39 millones [33,1 millones-45,7 millones] de personas en todo el mundo vivían con el VIH en 2022.
 - 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] de personas se infectaron por el VIH en 2022.
 - 630 000 [480 000-880 000] personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida en 2022.
 - 29,8 millones de personas accedían a la terapia antirretroviral en 2022.
 - 85,6 millones [64,8 millones-113,0 millones] de personas se han infectado por el VIH y 40,4 millones [32,9 millones-51,3 millones] han muerto por enfermedades relacionadas con el sida desde el inicio de la epidemia.
-

Personas que viven con el VIH

- En 2022, había 39 millones [33,1 millones-45,7 millones] de personas que vivían con el VIH.
 - 37,5 millones [31,8 millones-43,6 millones] de adultos (15 años o más).
 - 1,5 millones [1,2 millones-2,1 millones] de niños (0-14 años).
 - El 53% de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas.
 - El 86% [73- >98%] de todas las personas que viven con el VIH conocían su estado serológico en 2022.
-

Personas seropositivas que reciben terapia antirretroviral

- A finales de diciembre de 2022, 29,8 millones de personas (el 76% [65-89%] de todas las personas seropositivas) recibían tratamiento antirretroviral, frente a los 7,7 millones de 2010.
 - El 77% [65-90%] de los adultos mayores de 15 años tenían acceso al tratamiento; sin embargo, sólo el 57% [44-78%] de los niños de 0 a 14 años tenían acceso.
 - El 82% [69-95%] de las mujeres de 15 años o más tenían acceso al tratamiento; sin embargo, sólo el 72% [60-84%] de los hombres de 15 años o más tenían acceso.

- En 2022, el 82% [64-98%] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tenían acceso a medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión del VIH a sus hijos.
- 9,2 millones de personas seropositivas no tenían acceso a tratamiento antirretroviral en 2022.

Nuevas infecciones por VIH

- Las nuevas infecciones por VIH se han reducido en un 59% desde el pico alcanzado en 1995.
 - En 2022, 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] de personas se infectaron por el VIH, frente a 3,2 millones [2,5 millones-4,3 millones] en 1995.
 - Las mujeres y las niñas representaron el 46% de todas las nuevas infecciones en 2022.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por VIH se han reducido en un 38%, pasando de 2,1 millones [1,6 millones-2,8 millones] a 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] en 2022.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH entre los niños se han reducido en un 58%, pasando de 310 000 [210 000-490 000] en 2010 a 130 000 [90 000-210 000] en 2022.
-

Muertes relacionadas con el sida

- Las muertes relacionadas con el sida se han reducido en un 69% desde el pico alcanzado en 2004 y en un 51% desde 2010.
 - En 2022, alrededor de 630 000 [480 000-880 000] personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo, frente a los 2,0 millones [1,5 millones-2,8 millones] de 2004 y los 1,3 millones [970 000-1,8 millones] de 2010.
 - La mortalidad relacionada con el sida ha disminuido un 55% entre las mujeres y las niñas y un 47% entre los hombres y los niños desde 2010.
-

Mujeres y niñas

- A nivel mundial, el 46% de las nuevas infecciones por VIH se produjeron entre mujeres y niñas en 2022.
- En el África subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes representaban más del 77% de las nuevas infecciones entre los jóvenes de 15 a 24 años en 2022.

- En el África subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) tenían más del triple de probabilidades de contraer el VIH que sus compañeros varones en 2022.
- Cada semana, 4000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron por el VIH en todo el mundo en 2022. 3100 de estas infecciones se produjeron en el África subsahariana.
- En 2021, sólo alrededor del 42% de los distritos con alta incidencia del VIH en África subsahariana contaban con programas específicos de prevención del VIH para adolescentes y mujeres jóvenes.

Grupos de población clave

- A escala mundial, la prevalencia media del VIH entre la población adulta (15-49 años) era del 0,7%. Sin embargo, la prevalencia media era mayor entre los grupos de población clave:
 - 2,5% entre los profesionales del sexo
 - 7,5% entre los gays y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
 - 5,0% entre los consumidores de drogas inyectables
 - 10,3% entre las personas transexuales
 - 1,4% entre los reclusos.

Pruebas y objetivos de tratamiento (95-95-95)

- En 2022, el 86% [73- >98%] de todas las personas que vivían con el VIH conocían su estado serológico. Entre las personas que conocían su estado serológico, el 89% [75- >98%] recibía tratamiento. Y entre las personas que accedían al tratamiento, el 93% [79- >98%] estaban viralmente suprimidas.
 - Entre todas las personas que vivían con el VIH, el 86% [73- >98%] conocía su estado serológico, el 76% [65-89%] recibía tratamiento y el 71% [60-83%] tenía supresión viral en 2022.
 - Cinco países -Botsuana, Eswatini, Ruanda, la República Unida de Tanzania y Zimbabue- habían alcanzado los objetivos 95-95-95 para 2022.
-

Financiación

- En 2022 se disponía de un total de 20 800 millones de dólares (dólares constantes de 2019) para programas de VIH en países de ingresos bajos y medios, un 2,6% menos que en 2021 y muy por debajo de los 29 300 millones de dólares necesarios para 2025.
- Alrededor del 60% de los recursos disponibles en 2022 procedían de fuentes nacionales, frente a alrededor del 50% en 2010.
- La reducción de los recursos disponibles para el VIH en 2022 se debe al descenso de la financiación tanto internacional como nacional. Los 8.300 millones de dólares de financiación externa para el VIH en 2022 fueron un 3% inferiores a los de 2021. Al mismo tiempo, la financiación nacional está disminuyendo.
- La financiación bilateral del Gobierno de los Estados Unidos constituyó el 58% de toda la ayuda internacional para el VIH, mientras que los desembolsos del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria representaron alrededor del 29%. Otros donantes internacionales aportaron el resto, pero ese porcentaje ha disminuido considerablemente, de aproximadamente 3.000 millones de dólares en 2010 a 1.200 millones en 2022, lo que supone un descenso del 61%.
- Se calcula que en 2022 había un déficit de financiación del 90% para los programas de prevención del VIH entre personas de grupos de población clave, en comparación con la financiación necesaria para 2025.

Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2021	2022
Personas que viven con el VIH	26,6 millones [22,6 millones - 31,2 millones].	28,9 millones [24,5 millones - 33,8 millones].	31,5 millones [26,7 millones - 36,8 millones].	38,7 millones [32,8 millones - 45,2 millones].	39,0 millones [33,1 millones - 45,7 millones].
Nuevas infecciones por VIH	2,8 millones [2,2 millones - 3,8 millones].	2,5 millones [1,9 millones - 3,3 millones].	2,1 millones [1,6 millones - 2,8 millones].	1,4 millones [1,1 millones - 1,8 millones].	1,3 millones [1,0 millones - 1,7 millones].
Nuevas infecciones por VIH (Adultos, mayores de 15 años)	2,3 millones [1,7 millones - 3,1 millones].	2,0 millones [1,5 millones - 2,6 millones].	1,8 millones [1,4 millones - 2,4 millones].	1,3 millones [950 000 - 1,7 millones].	1,2 millones [900 000 - 1,6 millones].
Nuevas infecciones por el VIH (niños de 0 a 14 años)	530 000 [360 000 - 830 000]	480 000 [330 000 - 750 000]	310 000 [210 000 - 490 000]	140 000 [96 000 - 220 000]	130 000 [90 000 - 210 000]
Muertes relacionadas con el sida	1,7 millones [1,3 millones - 2,4 millones].	2,0 millones [1,5 millones - 2,7 millones].	1,3 millones [970 000 - 1,8 millones].	660 000 [500 000 - 920 000]	630 000 [480 000 - 880 000]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas ONUSIDA 2023.

Datos regionales - 2022

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones por VIH	Nuevas infecciones por VIH (Adultos, mayores de 15 años)	Nuevas infecciones por el VIH (niños de 0 a 14 años)	Muertes relacionadas con el sida
Global	39,0 millones [33,1 millones - 45,7 millones].	1,3 millones [1,0 millones - 1,7 millones].	1,2 millones [900 000 - 1,6 millones].	130 000 [90 000 - 210 000]	630 000 [480 000 - 880 000]
Asia y Pacífico	6,5 millones [5,3 millones - 7,8 millones].	300 000 [220 000 - 400 000]	290 000 [210 000 - 380 000]	12 000 [8600 - 18 000]	150 000 [110 000 - 220 000]
Caribe	330 000 [290 000 - 380 000]	16 000 [11 000 - 21 000]	14 000 [10 000 - 19 000]	1 500 [1 100 - 2 100]	5 600 [4100 - 7500]
África oriental y meridional	20,8 millones [17,4 millones - 24,5 millones].	500 000 [370 000 - 670 000]	440 000 [330 000 - 590 000]	58 000 [38 000 - 100 000]	260 000 [200 000 - 370 000]
Europa del Este y Asia Central	2,0 millones [1,8 millones - 2,1 millones].	160 000 [140 000 - 180 000]	160 000 [130 000 - 180 000]	... [... - ...]	48 000 [38 000 - 58 000]
América Latina	2,2 millones [2,0 millones - 2,5 millones].	110 000 [94 000 - 130 000]	110 000 [90 000 - 130 000]	3800 [2900 - 4700]	27 000 [21 000 - 35 000]
Oriente Próximo y Norte de África	190 000 [160 000 - 220 000]	17 000 [13 000 - 23 000]	16 000 [12 000 - 21 000]	1700 [1300 - 2100]	5300 [4000 - 7100]
África occidental y central	4,8 millones [4,2 millones - 5,5 millones].	160 000 [110 000 - 250 000]	110 000 [66 000 - 190 000]	51 000 [34 000 - 69 000]	120 000 [96 000 - 160 000]
Europa occidental y central y Norteamérica	2,3 millones [1,9 millones - 2,6 millones].	58 000 [46 000 - 69 000]	57 000 [46 000 - 69 000]	... [... - ...]	13 000 [9300 - 17 000]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas ONUSIDA 2023.

Cobertura regional del tratamiento - 2022

	Entre las personas que viven con el VIH, el porcentaje en TAR (Adultos, mayores de 15 años)	Entre las personas que viven con el VIH, el porcentaje que recibe tratamiento antirretroviral (niños de 0 a 14 años)	Entre las personas que viven con el VIH, el porcentaje que recibe tratamiento antirretroviral
Global	77% [65 - 90]	57% [44 - 78]	76% [65 - 89]
Asia y Pacífico	65% [54 - 78]	... [... - ...]	65% [54 - 78]
Caribe	69% [60 - 79]	39% [31 - 48]	68% [59 - 78]
África oriental y meridional	83% [70 - 98]	64% [49 - 93]	83% [69 - 97]
Europa del Este y Asia Central	51% [46 - 56]	... [... - ...]	51% [46 - 56]
América Latina	72% [65 - 81]	39% [33 - 45]	72% [64 - 80]
Oriente Próximo y Norte de África	51% [44 - 60]	34% [29 - 40]	50% [43 - 59]
África occidental y central	82% [72 - 95]	37% [29 - 45]	78% [69 - 90]
Europa occidental y central y Norteamérica	76% [64 - 87]	... [... - ...]	76% [64 - 87]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas ONUSIDA 2023.